

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!



informace pro chovatele



Státní
veterinární
správa

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi



Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz

POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!



informace pro občany




Státní
veterinární
správa

Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenositelná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření

- nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
- šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
- krmení divokých prasat
- odhazování potravin v přírodě
- dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP



Metody boje s AMP

- omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
- zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
- vyhnout se oblastem s výskytem AMP
- případný nálezh uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz

POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!



informace pro chovatele



Státní
veterinární
správa

Co je africký mor prasat?


Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenositelná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření

- kontakt domácích prasat s prasaty divokými
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím dopravních prostředků, krmiva, steliva...
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděvy, obuv, svačiny)

Metody boje s AMP

- zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými
- omezení vstupu (vjezdu) cizím osobám
- důsledná dezinfekce, dezinfekce a deratizace
- použití výhradně bezpečného krmiva a steliva i vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
- zamezení vstupu osobám, které byly v kontaktu s divokými prasaty, minimálně na 48 hodin



Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz

POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!



informace pro myslivce




Státní
veterinární
správa

Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném masu z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenositelná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření

- šíření vzájemným kontaktem v populaci divokých prasat
- uhynulá divoká prasata v honitbách
- vysoká hustota populace prasat divokých
- krmení divokých prasat
- zdrojem viru mohou být i potraviny obsahující vepřové maso
- trofeje z divočáků



Metody boje s AMP

- trvalé a dlouhodobé zvýšení lovu prasat divokých včetně bachyní
- intenzivní vyhledávání uhynulých kusů, odesílání vzorků k laboratornímu vyšetření
- dodržování zásad biologické bezpečnosti při lovu a zpracování zvěřiny

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz